

مددجوی عزیز :

غده تیروئید دو هورمون وابسته به هم به نام های تیروکسین T_4 و تری یدوتیرونین T_3 تولید می کند: این هورمون ها نقش مهمی در مراحل مختلف تکاملی بدن بر عهده دارند و به تثبیت سیستم حرارتی و متابولیک بدن کمک می کنند. در کم کاری تیروئید میزان این هورمون ها کاهش می یابد. علت هایی که می تواند باعث کم کاری تیروئید شود عبارتند از : کمبود ید، بیماری های خود ایمنی، جراحی، درمان با ید رادیواکتیو، قرار گرفتن در معرض تشعشع، مشکل هیپوفیزی

علائم بالینی :

خستگی و ضعف و خواب آلودگی، خشکی پوست و مو، حالت پف آلودگی صورت، اختلال در تمرکز و حافظه و مشکلات عصبی، کاهش اشتها و افزایش وزن، مشکلات قلبی و عروقی، اختلالات شنوایی، خشونت و کلفتی صدا، تنگی نفس، اختلالات گوارشی.

بررسی های تشخیصی :

آزمایش خون و اندازه گیری T_4 ، TSH در خون

درمان :

- دارو درمانی

- درمان جراحی، شیمی درمانی یا رادیوتراپی

نکات آموزشی

● رژیم غذایی :

- ✓ رژیم پر فیبر و کم کالری مصرف نمایید..
- ✓ مصرف نمک ید دار را محدود نمایید.
- ✓ از سبزیجات و میوه جات فراوان استفاده کنید تا از بروز یبوست پیشگیری شود.
- ✓ در صورت چاقی، توصیه می شود که از مصرف غذاهای نشاسته دار و پرچرب پرهیز شود و از برنج، نان، سیب زمینی و شیرینی جات به میزان کم استفاده شود.
- ✓ از مصرف کلم و شلغم خودداری نمایید.

● فعالیت :

- تحرک و فعالیت ورزشی منظم داشته باشید
- فعالیت و استراحت را بطور متناوب در زندگی خود داشته باشید.
- در فعالیت های تفریحی بدون استرس شرکت نمایید.

● کنترل دمای بدن :

- یکی از عوارض کم کاری تیروئید، کاهش دمای بدن است، لذا توصیه می شود :
- خود را با لباس یا پتوی اضافی بپوشاند.
- از منابع حرارتی خارجی مثل پتوهای برقی یا بالشتک های گرماده استفاده نکنید.
- به طور مرتب دمای بدن خود را کنترل کنید.
- در محیط های سرد قرار نگیرید.

- در فصل زمستان به اندازه کافی لباس گرم بپوشید.

● پیشگیری / کاهش یبوست

- مایعات فراوان مصرف نمایید.
- از سبزیجات و میوه جات و غذاهای پرفیبر و غذاهای آبدی استفاده نمایید.
- از مصرف مواد غذایی که یبوست را تشدید می کند مانند برنج، موز و غذاهای خشک و ... تا حد امکان اجتناب کنید.
- داشتن تحرک و انجام ورزش و فعالیت
- در صورتی که با انجام اقدامات فوق هنوز دچار یبوست هستید، توصیه می شود که از مواد مسهل (پودر پسیلیوم، سی- لاکس و ...) به صورت غیرمداوم استفاده شود. لازم به ذکر است که این داروهای گیاهی صبح ناشتا و با آب فراوان مصرف شوند.

● دارودرمانی

در صورت تجویز هورمون های تیروئیدی مانند لووتیروکسین به نکات زیر توجه نمایید :

- این دارو باید صبح ناشتا مصرف شود، در افراد پیر، مبتلا به ناراحتی های قلبی و عروقی با احتیاط مصرف شود.
- غذاهای حاوی فیبر، کلسیم، آهن و سویا با مصرف لووتیروکسین تداخل دارند، بنابراین توصیه می شود که از مصرف قرص لووتیروکسین با غذاهای فوق اجتناب شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

کم کاری تیروئید



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بازنگری تابستان ۱۴۰۵

▲ از رفتن بیمار به اماکن شلوغ بخصوص درفصول سرما اجتناب شود.

▲ در صورت بروز علائم عفونت (تب، لرز، احساس ناخوشی، ضعف، بی‌اشتهایی) به پزشک مراجعه شود و پزشک را از مصرف هورمون‌های تیروئیدی خود مطلع نمایید.

تنظیم خانواده

در خانم‌های دچار کم کاری تیروئید، بی‌نظمی در قاعدگی موجب تخمک‌گذاری نامنظم می‌شود، بنابراین به این افراد توصیه می‌شود در صورتی که در سنین باروری قرار دارند پس از مشورت با پزشک از روش‌های مناسب جهت پیشگیری از بارداری استفاده کنند. لازم به توضیح است که استفاده از قرص‌های و هورمون‌های ضد بارداری در این افراد منع مصرف دارد.

در صورت داشتن سوال در منزل، ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن ۰۲۷-۳۳۷۹۰۶۲۰-۰۲۸ داخلی ۵۰۹۷ واحد آموزش سلامت تماس بگیرید.

❑ مصرف لووتیروکسین در فردی که از قبل در حال دریافت داروهای ضد دیابت بوده است می‌تواند باعث افزایش قند خون شود بنابراین در این بیماران، میزان انسولین یا داروهای ضد دیابت خوراکی باید مجدداً تنظیم شود.

❑ توصیه می‌شود که بیماران در رژیم غذایی خود از منابع غنی کلسیم (لبنیات، لوبیای سویا و ...) و ویتامین D (روغن ماهی، زرده تخم مرغ، نور آفتاب) به میزان کافی استفاده کنند.

❑ توصیه می‌شود که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و تغییر در تعداد ضربان قلب سریعاً با پزشک تماس گرفته شود.

❑ توصیه می‌شود که از قطع خودسرانه این داروها اجتناب شود و میزان دارو کم یا زیاد گردد.

پیشگیری از عفونت

▲ توصیه می‌شود که بهداشت فردی رعایت شود.

▲ در صورت بروز علائم عفونت (تب، لرز، احساس ناخوشی، ضعف، بی‌اشتهایی) به پزشک مراجعه شود و پزشک را از مصرف هورمون‌های تیروئیدی خود مطلع نمایید.

▲ از تماس با افراد مبتلا به بیماری‌های عفونی اجتناب شود.